

APRES L'INTERVENTION

☐ Dans la chambre

Les aides-soignantes pourront répondre aux besoins du patient et lui apporter une collation lorsqu'il sera réveillé.

Les infirmières du service surveilleront le réveil du patient, retireront le matériel de voie veineuse, et vérifieront sa tension et sa vigilance.

Le chirurgien-dentiste et l'anesthésiste viendront voir le patient dans la chambre avant sa sortie.

Le bilan des soins réalisés vous sera remis oralement et un compte rendu envoyé au dentiste.

☐ Au domicile

Prescription :

Respectez la prescription qui vous aura été remise.

Alimentation

Le soir de l'intervention le patient peut prendre un repas léger, de préférence froid.

Hygiène dentaire :

Le brossage des dents peut être repris dès le lendemain de l'intervention, en évitant les zones des dents extraites. N'utilisez pas de bains de bouche avant un délai de 24 heures.

Sutures :

Les fils de suture se résorberont spontanément en quelques semaines.

Activités

Généralement, l'enfant peut reprendre ses activités 24 heures après l'intervention, sauf prescription

contraire précisée par l'anesthésiste ou par le chirurgien-dentiste.

SUIVI POST OPERATOIRE

L'enfant doit être vu en consultation post-opératoire, soit par un praticien de l'unité soit par le chirurgien-dentiste qui le suit habituellement.

Pour se renseigner

Pour une consultation d'anesthésie/ou contrôle :

04.71.50.51.87

Mail : handiconsult@ch-brioude.fr

En cas d'urgence après une intervention :

Service des Urgences : **Tel : 04.71.50.98.00**

Les intervenants

Dr GUYOT

Dr MAZILLE ROUEL

Dr PICARD

Dr ZEENNY



Pour se préparer à une intervention

SOINS DENTAIRES SOUS ANESTHESIE GENERALE

**Centre Hospitalier
BRIOUDE**

**2 rue Michel de L'Hospital
BP 140
43100 BRIOUDE CEDEX**

Accueil:

Tel: 04.71.50.99.99

Fax: 04.71.50.99.98

www.ch-brioude.fr



Vous avez consulté un chirurgien-dentiste pour votre enfant ou l'enfant dont vous avez la responsabilité.

Le chirurgien-dentiste vous a informé(e) qu'une anesthésie générale est nécessaire pour pouvoir réaliser les soins de l'enfant dans de bonnes conditions.

L'intervention aura lieu dans le cadre du service de chirurgie ambulatoire du CH de BRIOUDE et sera pratiquée par l'un des praticiens de l'Unité ... qui connaîtra le dossier de l'enfant.

AVANT L'INTERVENTION

L'enfant doit avoir une consultation avec un médecin anesthésiste au CH de BRIOUDE.

Vous allez recevoir un courrier pour préciser la date, l'heure et le lieu de cette consultation d'anesthésie.

Il est inutile d'appeler le service avant d'avoir reçu ce courrier. La date de l'intervention pour soins dentaires vous sera confirmée lors de cette consultation.

Présentez-vous à cette consultation avec :

- **L'enfant**
- **Son carnet de santé**
- **Les courriers de médecins spécialistes et les ordonnances récentes si l'enfant a des problèmes de santé particuliers**
- **La radiographie dentaire si le chirurgien-dentiste en a prescrit une.**

L'infirmière et/ou le médecin anesthésiste pourront répondre à vos questions.

PENDANT L'INTERVENTION

L'objectif de l'intervention est de supprimer les foyers dentaires infectieux et douloureux qui peuvent gêner l'enfant ou présenter un risque pour sa santé.

Dans la mesure du possible, le praticien essaiera de conserver le maximum des dents qui sont fonctionnelles.

Les soins conservateurs

Les **incisives** et les canines seront reconstituées avec une résine composite ou un ciment au fluor.



Les **molaires** seront reconstituées avec un amalgame si la lésion est petite, ou une coiffe préformée en métal si la lésion est importante.



Les dents de lait qui sont coiffées évolueront ensuite normalement et seront remplacées par une dent définitive entre 10 et 12 ans. La coiffe tombera avec la dent.

Les dents présentant des **caries importantes** feront l'objet d'un traitement pulpaire.



Quand les bactéries de la carie atteignent la pulpe, la dent doit être désinfectée. Le traitement pulpaire peut être partiel (pulpotomie) ou total (traitement endodontique).

Les extractions

Les dents infectées associées à un foyer osseux seront extraites. Les sutures seront réalisées avec du fil résorbable, les fils tomberont spontanément.

Les dents de laits mobiles et prêtes à tomber seront extraites, sauf demande particulière.

Les soins préventifs

Les sillons des molaires définitives seront scellés, avec un ciment au fluor pour éviter l'apparition de nouvelles caries.

A la fin de l'intervention, toutes les dents seront polies avec une pâte fluorée.

La durée de l'intervention dépend essentiellement du nombre de dents à traiter. Elle peut varier de 30 mn à 1h30. L'enfant sera ensuite surveillé en salle de réveil puis sera ramené dans sa chambre.